

ROMÂNIA

În anul 2017:

- 12.400 (76%) din persoanele infectate cu HIV beneficiază de tratament cu medicamente antiretrovirale.
- 19 % din totalul pacienților cu TB sunt HIV pozitivi.
- < 200 de decese cauzate de HIV/SIDA.

Sursa: <http://apps.who.int/gho/data/node.imr>

- Cea mai frecventă cale de transmitere a HIV/SIDA, a fost cea **sexuală**, respectiv *heterosexuală* (63,20%), în perioada 2007-2016.
- Transmiterea **prin sânge** (la consumatorii de droguri) a avut cea mai mare pondere în 2012 (30,06%).

Sursa: [http://www.cnlas.ro/images/doc/31122016\\_rom.pdf](http://www.cnlas.ro/images/doc/31122016_rom.pdf)



- Utilizați un prezervativ nou la fiecare contact sexual.
- Citiți ambalajul și verificați data de expirare.
- Asigurați-vă că nu are defecte.
- Puneți-vă prezervativul înainte de a face sex.



reeditat de.  
Direcția de Sănătate Publică Iași  
Promovarea Sănătății



# Stop SIDA! Informează-te despre HIV!

## ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA HIV/SIDA

1 decembrie



Direcția de Sănătate Publică Iași  
Promovarea Sănătății

## Cum se transmite HIV:

- ❖ Prin **contactul sexual neprotejat** -principalul factor de risc în transmiterea virusului imunodeficienței umane (HIV).
- ❖ Prin folosirea de **ace și/sau seringi nesterile**.
- ❖ Prin **instrumentar medical sau alte obiecte tăioase** contaminate cu HIV.
- ❖ Prin **transfuzii de sânge sau alte produse biologice** contaminate cu HIV.
- ❖ De **la mamă la făt** în timpul sarcinii/nașterii sau după naștere prin alăptare.

## Cum nu se transmite HIV :

- ❖ strângere de mână;
- ❖ îmbrățișare;
- ❖ sărut;
- ❖ strănut, tuse, lacrimi, transpirație;
- ❖ atingerea pielii fără leziuni;
- ❖ folosirea aceleiași grup sanitar în condiții igienice;
- ❖ folosirea în comun a prosoapelor, tacâmurilor, clanțelor, telefonului, computerului, jucăriilor;
- ❖ resuscitarea gură-la-gură ;
- ❖ apă sau alimente.

## Cum se poate preveni HIV:

1. Eliminarea sau reducerea riscului de infectare cu HIV prin contact sexual (utilizarea corectă a prezervativului).
2. Consilierea cuplului înainte de sarcină; testarea și consilierea pentru HIV și infecții transmise pe cale sexuală.
3. Profilaxia pre- și post-expunere pentru partenerul/a HIV-negativ.
4. Reducerea riscurilor pentru persoanele care își injectează droguri: folosirea medicamentelor de substituție administrate pe cale orală.

## Tratamentul HIV/SIDA:

- ❑ **Tratamentul antiretroviral** poate încetini evoluția afecțiunii și poate permite o viață lungă și relativ sănătoasă.
- ❑ În cazul unei expuneri la virus în ultimele 72 de ore, medicamentele anti-HIV, administrate pentru profilaxia post-expunere, pot opri infecția. **Tratamentul trebuie luat cât mai curând după contactul cu virusul!**

## HIV/SIDA LA NIVEL MONDIAL 2017

### Persoane care trăiesc cu HIV

- 36,9 milioane persoane HIV-pozitive (dintre care 35,1 milioane sunt adulți);

### Noi infecții cu HIV

- 1,8 milioane infecții HIV noi.

### Femei

- 7.000 de femei tinere cu vârste între 15-24 ani sunt infectate cu HIV în fiecare săptămână.
- Femeile cu vârste între 15 și 24 de ani au un risc de 2 ori mai mare de a fi infectate cu HIV decât bărbații.

### Decese cauzate de SIDA

- 940.000 de milioane decese datorate bolilor asociate SIDA la nivel mondial.

### Coinfecția HIV -TBC

- 1 din 3 din persoanele decedate din cauza SIDA aveau și TBC;
- În 2016, din 10,4 milioane de persoane care au dezvoltat TBC, 1,2 milioane erau infectate cu HIV.

### Terapia antiretrovirală (ART)

- La nivel global, aproximativ 60% din persoanele infectate cu HIV primesc ART.
- În Europa din 21,7 milioane de persoane HIV-pozitive 1.258.000 ((57,97%) persoane infectate cu HIV primesc ART.
- În 2017, 80% dintre femeile gravide infectate cu HIV au avut acces la ART pentru a preveni transmiterea HIV la copiii lor.
- Prin tratament, cantitatea de virus din sânge este redusă la un nivel la care riscul de a transmite infecția este foarte scăzut, iar persoanele pot fi considerate sănătoase .

DATE GENERALE România	31 DECEMBRIE 2017
<b>TOTAL HIV/SIDA</b> (cumulativ 1985-2017) din care:	<b>22.980</b>
TOTAL SIDA (CUMULATIV 1985 - 2017)	15.587
TOTAL HIV (CUMULATIV 1992 - 2017)	7.393
PIERDUȚI DIN EVIDENȚĂ HIV/SIDA COPII + ADULȚI	714
TOTAL DECESE SIDA (1985 - 2017)	7.257
<b>NUMĂR PACIENȚI HIV/SIDA ÎN VIAȚĂ, DIN CARE</b>	<b>5.009</b>
0-14 ANI	196
15 - 19 ANI	171
≥ 20 ANI	<b>14.642</b>
<b>CAZURI HIV/SIDA NOI DEPISTATE ÎN ANUL 2016</b>	<b>692</b>
CAZURI NOI HIV NOTIFICATE	399
CAZURI NOI SIDA NOTIFICATE	293
<b>DECESE 2017 HIV/SIDA</b>	<b>171</b>
<b>Total beneficiari tratament ARV</b>	<b>12.247</b>